

PREAMBULE

Cette information sur les médicaments «à utiliser avec précaution» par les myasthéniques a été préparée à partir d'éléments puisés aux meilleures sources, notamment le dictionnaire des spécialités Vidal et «la carte de soins et d'urgence» pour les patients, établie par le Ministère de la Santé avec le concours de l'AFM. L'information est délivrée en 2 versions, en fonction du critère de classement.

• NOTICE I •

Liste par grande famille thérapeutique
Pour les principes actifs nous avons généralement adopté la DCI (Dénomination Commune Internationale)

• NOTICE II •

Liste alphabétique par principe actif
Classement alphabétique des principes actifs pour un repérage rapide

! ATTENTION !

Bien que ces listes soient très complètes, elles ne prétendent pas être exhaustives ni se substituer à l'avis des spécialistes.

DOCUMENT BILINGUE

Un document bilingue d'information destiné à faciliter la prise en charge par les services d'urgence est commandable directement via le site de l'association. Son format «poche» 10x15cm permet de l'emporter en déplacement et en voyage



Association des Myasthéniques Isolés et Solidaires
Membre d'Euro Myasthenia Gravis Association

Web : www.myasthenie.fr

Forum : www.myasthenie.com

Mail : association.amis@myasthenie.com

Siège social :

4 impasse des marcassins
60520 La Chapelle en Serval

liste II v 2.2.1.a du 06-2022.

Pour obtenir la dernière version mise à jour,
connectez-vous sur :
http://www.myasthenie.com/ftp/pub/listes_medicaments/

Ou scannez le QR code ci-dessous



INFORMATION
Médicaments à utiliser
avec précaution par
les myasthéniques



NOTICE II
Liste alphabétique
par principe actif



Les principes actifs délivrés en **pharmacie** et formellement contre-indiqués sont en **caractères gras surlignés**, les autres sont à utiliser avec **! précaution !**
 En milieu **hospitalier**, les contre-indications sont à valider par l'équipe médicale

PRINCIPES ACTIFS DE SPÉCIALITÉS DELIVRÉES EN PHARMACIE

USAGE PRINCIPALEMENT HOSPITALIER

Acébutolol	Clonazépam	Hydroquinidine	Méphénésine	Oxybutynine	Sévoflurane	Adiphénine	Gallamine triiodoéthylate
Alprazolam	Clorzébate	Hydroxyzine	Méquitazine	Patchs nicotiniques	Solifenacine	Acuronium	Histapyrodine
Alimémazine	Clotiazépam	1 Interférons alfa	Méthocarbamol	Pefloxacin	Sotalol	Alfentanil	Idrocilamide
Aténolol	Colistine	2a/2b Iode	Métoprolol	Phéniramine	Telithromycine	Atracurium	Isépamicine
Azithromycine	Corticoides	injectable	Midazolam	Phénobarbital	Témazépam	Azatadine dimaléate	Isothipendyl
Baclofène	Dantrolène	Kanamycine	Mivacurium	Phényltoloxamine	Thiocolchicoside	Brotizolam	Kétazolam
Bétaxolol	Dexchlorphéniramine	Kétamine	Monoxyde d'azote	Phénytoïne	Tigécycline	Buclizine	Méfénidramium
Bromazépam	mine	Levofloxacine	Moxifloxacine	Pidolate de Mg	Timolol	Buzépidé métioure	Mépyramine maléate
Bromphéniramine	Diazépam	Lévomépromazine	Nadolol	Pindolol	Tiopronine	Camyloline	Methdilazine
Carbamazépine	Diltiazem	Lidocaïne IV	Néomycine	Pizotifène	Tobramycine	Carbinoxamine maléate	Octatropine méthylbromure
Cartéolol	Diphénhydramine	Lincomycine	Nétilmicine	Polymyxine	Vaccins vivants	Carisoprodo	Orphénadrine
Chlordiazépoxyde	Dipyridamole	Lithium	Nicotine (patch)	Prazépam	Vécuronium	Chlormézanone	Oxydipentonium
Chloroquine	Doxylamine	Loflazébate	Nifédipine	Procaïne	Vérapamil	Chlorphenoxamine	Oxyphencyclimine
Chlorphénamine	D-pénicillamine	d'éthyle	Nitrazépam	Prométhazine	Viraféronpeg	Chlorproéthazine	Pentapipéride fumarate
Chlorpromazine	Estazolam	Loprazolam	Nordazépam	Propafénone	Zopiclone	Cinnarizine	Propyromazine bromure
Ciprofloxacine	Etifoxine	Lorazépam	Ofloxacine	Propanolol	Zoplidem	Clémastine fumarate	Prozapine
Cisatracurium	Flunitrazépam	Magnésium IV	Oxatomide	Quinidine		Cloxacolam	Rolitétracycline
Clarithromycine	Fluphénazine	Magnésium per os	Oxazépam	Quinine		Cyclizine	Suxaméthonium
Clidinium	Gentamicine	Méclozine	Oxoméazine	Quinquina		Dibékacin	Tétracycline
Clindamycine	Halofantrine	Méfloquine	Oxprénolol	Rocuronium		Diméthyltubocurinium	Tényldiamine
Clobazam						Dipiprovérine	Thiazinamium
						Etipirium iodure	Thiopental
						Fencarbamide napadisilate	

Il est vivement recommandé de présenter ce document à tout médecin (généraliste, spécialiste, dentiste...) susceptible de prescrire un traitement. La même recommandation s'applique à tout pharmacien, conseillant un patient en automédication, ou à des fins de vérification en cas de doute.

Seul le médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un médicament et à évaluer le rapport bénéfices/risques d'une thérapie